

请将此说明书与药品一同保管，使用时请仔细阅读。  
本文为日文版药品说明书中文翻译，仅供参考。具体解释以日文版为准。

ひとみ・すこやか

Santen

第2類医薬品

用于预防眼疲劳、眼科疾病



大学目薬®

看电视、读报纸、读书、从事精细工作……用眼过度导致眼疲劳，引起各种不适症状（炎症及充血）。

大学目薬含有通过收敛作用抑制炎症的硫酸锌水合物及缓解瘙痒的扑尔敏等 4 种有效成分。可用于缓和眼疲劳及眼部不适症状。

## ⚠ 使用注意事项



### 咨询事项

1. 具有以下情况的人士，请在使用前向医生或药剂师咨询。

- (1) 正在接受医生治疗者；
- (2) 本人或家人是过敏体质者；
- (3) 曾产生药物过敏症状者；
- (4) 出现眼部剧烈疼痛症状者；
- (5) 被诊断为青光眼的患者；

2. 如出现以下情况，请立即停止使用，带上本说明书向医生或药剂师咨询。

(1) 使用后出现下列症状；

有关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
眼部	充血、发痒、肿胀

- (2) 视线模糊无法改善；
- (3) 使用 5~6 日症状仍未好转；

## 用法·用量

一次 2~3 滴，一日点眼 5~6 次。

### ●请遵守下列注意事项：

- (1) 若过度使用，会感觉光线异常刺眼，反而导致充血。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的监督指导下使用。
- (3) 请不要让容器的前端触及眼睑、睫毛（可引起结膜分泌物、菌等混入，会污染药水或造成浑浊）。请不要使用浑浊的药水。
- (4) 请不要在佩戴软性隐形眼镜时使用。
- (5) 请勿用于点眼以外的其他用途。



## 适应症

预防眼疲劳、眼科疾病（如游泳后，灰尘、汗水进入眼睛时等情况）、结膜充血、眼部瘙痒、由紫外线等光线引起的眼部炎症（如雪盲等）、视线模糊（结膜分泌物过多时等）、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）以及佩戴硬性隐形眼镜时的不适感。


## 成分·含量

成分	含量	作用
硫酸锌水合物	0.1%	通过收敛作用，抑制眼部炎症。
扑尔敏	0.01%	抑制组胺的作用，抑制眼部炎症及瘙痒。
萘甲唑啉硫酸盐	0.002%	抑制结膜（眼白部分）的充血。
$\epsilon$ -氨基己酸	1.0%	抑制炎症诱导物质的生成。

作为辅料含有三氯叔丁醇、香叶醇、氯化苯甲羟铵溶液、硼酸、d-龙脑、l-薄荷醇以及 pH 调节剂。

## 保管及使用注意事项

- (1) 请放在阳光无法直射的阴凉处密封保管。为保持产品质量，请勿放置于汽车内或暖气附近等高温的场所。另外本品放在高温场所，可能导致容器变形，致使药水漏出且药水质量变化，请勿使用。
- (2) 请置于儿童无法触及的地方保管。
- (3) 请勿放入其他容器中。（会导致误用或质量的改变）。
- (4) 请勿与他人合用。
- (5) 请勿使用超过使用期限的产品。另外即便在使用期限内，也请于开封后尽快使用。
- (6) 依据保存状态，点眼口周围或瓶盖内侧会有白色的成分结晶附着。这种情况下，请用干净的纱布轻轻擦拭后再使用。



**包装** 15mL

【为保护自然环境，本品不配有便携袋。敬请谅解。】

制造销售商  
**参天製薬株式会社**  
日本大阪府大阪市東淀川区下新庄 3-9-19  
www.santen.co.jp

有关商品和护眼信息请参照 [hitomi-sukoyaka.com](http://hitomi-sukoyaka.com)