

请将此说明书与药品一同保管，使用时请仔细阅读。  
本文为日文版药品说明书中文翻译，仅供参考。具体解释以日文版为准。

ひとみ・すこやか

Santen

第2類医薬品

给难受的视疲劳提供最大浓度的有效成分\*

# サンテメディカル10<sup>®</sup> [眼药水]

在向信息技术进化的社会中，用眼过度的场合越来越多。在这样的环境下，眼睛的聚焦调节功能会下降，容易发生眼疲劳（视力疲劳）。

サンテメディカル10最大浓度含有以改善视疲劳的维生素 B<sub>12</sub> 和以甲基硫酸新斯的明为中心的 5 种成分\*作用于聚焦调节肌肉和副交感神经，增强衰退的聚焦调节功能，与此同时补给眼部营养，促进组织代谢功能，改善视疲劳。

服务于大众“明眸·健康”的生活。

\*含有 一般用眼科用药制造认证标准的最大浓度：维生素 B<sub>12</sub>、甲基硫酸新斯的明、牛磺酸、L-天门冬氨酸钾、扑尔敏

## ⚠ 使用注意事项



### 咨询事项

1. 具有以下情况的人士，请在使用前向医生或药剂师咨询。

- (1) 正在接受医生治疗者；
- (2) 本人或家人是过敏体质者；
- (3) 曾产生药物过敏症状者；
- (4) 出现眼部剧烈疼痛症状者；
- (5) 被诊断为青光眼的患者；

2. 如出现以下情况，请立即停止使用，带上本说明书向医生或药剂师咨询。

(1) 使用后出现下列症状；

有关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
眼部	充血、发痒、肿胀

- (2) 视线模糊无法改善；
- (3) 使用 5~6 日症状仍未好转；

## 用法·用量

一次 2~3 滴，一日点眼 5~6 次。

### ●请遵守下列注意事项：

- (1) 若过度使用，会感觉光线异常刺眼，反而导致充血。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的监督指导下使用。
- (3) 请不要让容器的前端触及眼睑、睫毛（可引起结膜分泌物、菌等混入，会污染药水或造成浑浊）。请不要使用浑浊的药水。
- (4) 请不要在佩戴软性隐形眼镜时使用。
- (5) 请勿用于点眼以外的其他用途。



## 适应症

预防眼疲劳、视线模糊（结膜分泌物过多时等）、结膜充血、眼部瘙痒、眼科疾病（如游泳后，灰尘、汗水进入眼睛时等情况）、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）、由紫外线等光线引起的眼部炎症（如雪盲等）以及佩戴硬性隐形眼镜时的不适感。

接背面

## 成分・含量

成分	含量	作用
维生素 B <sub>12</sub> (氰钴胺)	0.02%	促进睫状肌的功能, 改善眼疲劳。
甲基硫酸新斯的明	0.005%	经由改善聚焦调节功能的作用, 改善眼部疲劳等症状。
维生素 B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)	0.05%	加强眼部的组织代谢。
泛醇	0.05%	加强眼部的组织代谢。
L- 天门冬氨酸钾	1.0%	促进眼部组织呼吸。
牛磺酸	1.0%	加强眼部的组织代谢。
扑尔敏	0.03%	抑制组胺的作用, 抑制眼部炎症及瘙痒。
ε - 氨基己酸	1.0%	抑制炎症诱导物质的生成。
甘草酸二钾	0.1%	抑制眼部炎症。
盐酸四氢唑啉	0.03%	抑制结膜 (眼白部分) 的充血。


作为辅料含有 EDTA 二钠、三氯叔丁醇、氯化苯甲烃铵溶液、硼酸、d- 龙脑、l- 薄荷醇以及 pH 调节剂。

### < 有关成分及含量的注意事项 >

使用本品点眼后, 有时会感觉口中有甜味。这是由于作为成分之一的甘草酸二钾通过泪道流入口中引起的, 并非因质量异常而引起。

### 保管及使用注意事项

- (1) 请放在阳光无法直射的阴凉处密封保管。为保持产品质量, 请勿放置于汽车内或暖气附近等高温的场所。另外本品放在高温场所, 可能导致容器变形, 致使药水漏出且药水质量变化, 请勿使用。
- (2) 请置于儿童无法触及的地方保管。
- (3) 请勿放入其他容器中。(会导致误用或质量的改变)。
- (4) 请勿与他人合用。
- (5) 请勿使用超过使用期限的产品。另外即便在使用期限内, 也请于开封后尽快使用。
- (6) 依据保存状态, 点眼口周围或瓶盖内侧会有白色的成分结晶附着。这种情况下, 请用干净的纱布轻轻擦拭后再使用。
- (7) 本品的红色为维生素 B<sub>12</sub> (氰钴胺) 的颜色。即便点眼过程中药液洒出沾染上衣, 水洗后也不会留下痕迹。



**包装** 12mL

制造销售商  
**S 参天製薬株式会社**  
日本大阪府大阪市東淀川区下新庄 3-9-19  
www.santen.co.jp

有关商品和护眼信息请参照 [hitomi-sukoyaka.com](http://hitomi-sukoyaka.com)